

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ LIPOPROF ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ / МЕЗОРОЛЛЕР



КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (ЯГОДИЦЫ, БЕДРА)

Эффект:

- уменьшение объемов жировой ткани, коллагеностимулирующее действие, лимфодренаж.

Рекомендован следующий курс процедур:

- от 3 до 6 процедур, в зависимости от локально-жировых отложений с периодичностью 7-10 дней.
- для поддержания результата повторить через 4-6 месяцев.

Расход на одну процедуру:

- 5-10 мл в зависимости от области применения препарата.

Препарат:

- липолитик Lipoprof.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Двукратно обработать зону воздействия хлоргексидином на водной основе. Убедиться, что поверхности кожи целые, чистые, без признаков воспаления.

Наносить препарат на обрабатываемые зоны бедер и ягодиц каплями до и после обработки аппаратом.

Меры предосторожности:

области нанесения препаратов не следует подвергать интенсивному нагреванию (на солнце или в солярии) или сильному охлаждению.

Остаток неиспользованного материала после выполнения процедуры подлежат немедленной утилизации.

**Хранить в защищенном от солнечного света месте, при температуре от 4 до 25°C.
Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока годности.**