

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ TRICHOLOX: ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТЕЛОГЕНОВЫХ АЛОПЕЦИЯХ, ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС ПРИ ОБЕЗВОЖЕННЫХ И УСТАВШИХ ВОЛОСАХ

Расход на 1 процедуру:

1 ампула Tricholax (2 мл)

Способ применения:

Первый этап:

- 1 Консультация трихолога (сбор жалоб, анамнеза, визуальный осмотр, оценка состояния кожи головы, трихоскопия);
- 2 Развернутый биохимический анализ крови;
- 3 Серологические реакции на сифилис;
- 4 Определение уровня гормонов щитовидной железы;
- 5 Спектральный анализ сыворотки крови и волос (атомно-абсорбционная спектроскопия) с целью выявления возможного нарушения обмена химических элементов.

На первичном приеме проводится подготовка (бритье и постановка татуажной метки) на двух участках в андрогензависимой и андрогеннезависимой зоне.

Второй этап через 48 часов после первичного приема:

- 1 Выполнить фототрихограмму в андрогензависимой и андрогеннезависимой зонах с помощью программы TrichoScience Pro v.1.4
Анализ полученных изображений можно проводить в программе Nautilus PhT v.1.1.3.1.
- 2 Оценить 5 снимков 0,2 см² в левом и правом верхних и нижних углах от метки и с меткой по центру.

Третий этап:

- 1 Перед проведением процедуры волосистую часть головы обработать 0,5% раствором хлоргексидина биглюконата.
- 2 Нанести 2 мл стерильного раствора препарата Tricholax на волосистую часть головы с последующей обработкой методом фракционной микроигльчатой терапии. Процедуру можно выполнять с помощью аппарата Dermarpen Му-М (Корея) в режиме дермаштампа стерильными иглами 32G на глубину 1–1,5 мм 1 раз в 6–7 дней, курс – 10 процедур.
- 3 Запретить мытье головы, занятия спортом, посещение сауны, пребывание на активном солнце в течение 24 часов после процедуры.
- 4 Для выявления эффективности по окончании повторить трихоскопию и фототрихограмму в тех же зонах.